

Iverdrop

Solution spot-on pour les oiseaux de cage et de volière.

Composition : ivermectine 0,12 %.

Médicament vétérinaire exempté d'enregistrement.

Indication

Lutte contre les acariens, *Sternostoma tracheacolum* (acarien de la trachée et acarien du sac aérien), la gale de la perruche (*face écaillée*) et les pattes crayeuses.

Lutte contre les poux de sang (*Dermanyssus gallinea*), les poux des arbres et des plumes (*Mallophaga*).

Contre-indications

Ne pas utiliser chez les animaux malades ou affaiblis.

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité connue au principe actif ou à l'un des excipients.

Effets secondaires

Dans de rares cas, une irritation locale de la peau se produit.

Dans de très rares cas, dépression du système nerveux central, avec toutes sortes d'effets indésirables : apathie, perte d'appétit, mydriase, ataxie, tremblements musculaires, faiblesse musculaire, diarrhée.

Si vous constatez des effets indésirables graves ou d'autres types d'effets non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre vétérinaire.

Dosage**Mode d'emploi**

Canaris, oiseaux tropicaux : 1 goutte dans le cou.

Perruches (herbe) et oiseaux plus grands : 2 gouttes dans le cou.

L'emballage contient une pipette pour faciliter le dosage.

En cas de détection d'acariens respiratoires ou de gale, tous les oiseaux de la volière doivent être traités.

Appliquez la ou les gouttes sur la peau du cou de l'animal, de manière à ce que le liquide ne puisse pas être léché.

Ce faisant, les plumes doivent être écartées le plus possible.

Le traitement peut être répété après 4 semaines pour éviter une réinfection. Il est préférable de traiter les oiseaux 1 à 2 mois avant la période de reproduction afin de prévenir l'infection des nids.

En cas d'infestation par l'acarien de la trachée, il convient également de nettoyer et de désinfecter le poulailler, les mangeoires et les abreuvoirs, ainsi que les bacs dans lesquels les oiseaux se baignent.

Mesures de sécurité pour l'utilisateur

Tenir hors de portée et de vue des enfants.

Essayer d'éviter tout contact avec la peau et les yeux.

Se laver les mains après utilisation. En cas de contact avec la peau, laver avec de l'eau et du savon.

En cas de contact avec les yeux, rincer à l'eau et contacter immédiatement un médecin.

Recommandations en matière de stockage et d'élimination

Conserver dans le récipient d'origine à température ambiante. Ne pas réfrigérer ou congeler.

Ne pas utiliser après la date de péremption.

Les médicaments vétérinaires non utilisés ou leurs résidus doivent être éliminés conformément aux exigences locales.

Distributeur :

Fendigo NV/SA

Herrmann Debrouxlaan 17

1160 Bruxelles

Belgique

Fabricant :

Beaphar B.V. Raalte

Pays-Bas